

Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

# Piedirosso

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

**Nome:** Piedirosso N.

**Codice:** 189

**Sinonimi ufficiali:** Piede di Colombo, Piede di Palumbo, Per E Palummo, Palombina

**Data di ammissione:** 25/05/1970, decreto pubblicato sulla G.U. 149 del 17/06/1970

## 2. INFORMAZIONI GENERALI

*Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: C. Violante e S. Bordignon - "Piedirosso", in Principali vitigni da vino coltivati in Italia - Volume III, 1964*

### 2.1. Sinonimi (ed eventuali errati)

Col nome di "Piedirosso" o "Piede di colombo" si indica nelle regioni meridionali un vitigno caratterizzato dall'aver il graso rosso come il piede di un colombo. Tale vitigno, inoltre, assume denominazioni diverse nelle varie zone di coltura. Infatti viene chiamato "Piedirosso" in alcuni comuni della provincia di Avellino; "Piede di colombo" o "Piede colombo" nelle Province di Benevento e di Avellino; "Perepalummo", "Palumbina nera" e "Piedepalumbo" nelle Province di Napoli, Caserta e Salerno; "Strepparossa" a San Severino e nella zona di Pozzuoli.

### 2.2. Descrizione Ampelografica

Questo vitigno è stato descritto utilizzando un clone di "Piedirosso" esistente presso la collezione ampelografica dell'Istituto Tecnico Agrario di Avellino. I caratteri rilevati nella predetta collezione sono stati successivamente confrontati con quelli riscontrati sul "Piedirosso" coltivato nelle Province di Napoli, Caserta, Salerno.

#### Germoglio di 10-20 cm

*Apice:* espanso, verde chiaro, lanuginoso.

*Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a):* distintamente a coppa la prima, leggermente a coppa o quasi spiegate la seconda e la terza, di color verde chiaro con riflessi violacei lungo tutto il margine; aracnoide la prima, cotonose la seconda e la terza; seno peziolare molto aperto.

*Foglioline basali (dalla 4a in poi):* spiegate, di color verde chiaro, cotonose le prime (dall'alto), glabre le successive; superficie del

lembo liscia; seno peziolare a V aperto.

*Asse del germoglio:* semieretto, cotonoso.

#### Germoglio alla fioritura

*Apice:* espanso, di color verde, cotonoso.

*Foglioline apicali:* leggermente a coppa, di color verde con sfumature bronzee nella pagina superiore, grigiastria la pagina inferiore; cotonose.

*Foglioline basali:* spiegate, di color verde con sfumature bronzee nella pagina superiore, grigiastria la pagina inferiore; glabre, appena trilobate; seno peziolare a V aperto.

*Asse del germoglio:* semieretto, glabro, di color verde o rossastro da un lato.

**Tralcio erbaceo:** verde con riflessi rossi più marcati sui nodi, di sezione trasversale ellittica, contorno angoloso, glabro.

**Vitici:** bifidi, e raramente trifidi, ben sviluppati, di color rossastro, intermittenti (formula: 0-1-2-0-1-2).

**Infiorescenza:** piramidale, lunga 15-20 cm.

**Fiore:** bottone florale quasi cilindrico, di media grandezza; autofertile.

**Foglia:** di media grandezza, quasi orbicolare, quinquelobata (raramente trilobata), seno peziolare a V molto aperto; seni laterali a lira molto profondi; seni laterali inferiori a lira chiusa con bordi sovrapposti, poco accentuati; lobi ben sviluppati specialmente il mediano, piani o cadenti; angolo alla sommità del lobo terminale quasi retto; lembo bolloso, piuttosto consistente; pagina superiore di color verde carico, lucida, glabra; pagina inferiore verde chiaro, vellutata; le nervature della pagina superiore sono verdi con riflessi rosso vinosi; nella pagina inferiore sono di color verde con sfumature rosso violacee alla base; sporgenti quelle di 1°, 2°, 3°, 4° ordine; dentatura irregolare con denti abbastanza pronunciati, a base piuttosto larga e margini rettilinei, mucrone poco sviluppato.

*Picciole:* lungo, di media grossezza, sezione trasversale circolare con canale poco evidente, glabro, di color verde con striature violacee, forma un angolo ottuso con il lembo.

*Colorazione autunnale delle foglie:* rossa intensa.

**Grappolo a maturità industriale:** di media grandezza o grande (cm 15-20), tozzo, con una o due ali ben sviluppate, mediamente

spargolo; peduncolo corto e robusto, semilegnoso, di color rosso vivo; pedicelli di media lunghezza, grossi, rossi; cercine evidente, ben sviluppato, liscio, di color rosso vivo.

**Acino:** di media grandezza o grosso (diametro mm 15,5), subsferoide, di forma e sezione trasversale regolare; buccia di color rosso violaceo intenso, regolarmente distribuito, pruinosa, spessa e quasi coriacea; ombelico persistente; polpa di media consistenza con sapore che ricorda la fragola, dolce; succo incolore o con leggeri riflessi rossi; pennello corto di color rosso; separazione del pedicello dall'acino è facile.

**Vinaccioli:** piriformi con becco poco sviluppato, grossi, in numero medio di due.

**Tralcio legnoso:** lungo, robusto ed elastico, povero di femminelle; sezione trasversale rotonda o subrotonda; superficie liscia, glabra; nodi poco ingrossati; diaframma convesso o piano-convesso; meristalli di media lunghezza, color rossastro con striature di marron scuro; gemme non molto sviluppate, quadrangolari, poco appuntite.

**Tronco:** robusto, di buona vigoria.

### 2.3. Fenologia

**Condizioni di osservazione:** vengono prese in considerazione quelle riguardanti la collezione dell'Istituto Tecnico Agrario di Avellino, nella quale trovasi il clone qui descritto.

#### Ubicazione

Per quanto riguarda l'ubicazione, il clima, il terreno, ecc., nonché le fasi vegetative della vite ed il calendario di maturazione dell'uva, si rimanda alla monografia del "Fiano", precedentemente pubblicata.

#### Fenomeni vegetativi

**Germogliamento:** prima decade di Aprile.

**Fioritura:** 1-9 Giugno.

**Invaiaura:** prima quindicina di Agosto.

**Maturazione dell'uva:** seconda epoca (15-25 Settembre).

**Caduta delle foglie:** tardiva (prima quindicina di Ottobre).

### 2.4. Caratteristiche ed Attitudini culturali

**Vigoria:** buona, preferisce potatura lunga.

**Produzione:** abbondante e costante.

**Posizione del primo germoglio fruttifero:** 2°-3° nodo.

**Numero medio di infiorescenze per germoglio:** due.

**Fertilità delle femminelle:** molto scarsa.

**Resistenza alle malattie:** normale resistenza all'oidio, più sensibile agli attacchi peronosporici; resiste molto al marciume dell'uva; è uno dei vitigni meno attaccati dalle tignole; rarissime l'acinellatura e la colatura.

**Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto:** normale.

### 2.5. Utilizzazione

Esclusivamente per la vinificazione.

## 3. COLTIVAZIONE

### 3.1 Classificazione

#### 3.1.1. Idonea

*In tutta la regione:* Campania, Puglia

*Nella provincia di:* Latina (Solo nelle isole Ponziane)

### 3.2 DOP ed IGP

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche.

#### 3.2.1. DOC

Campi Flegrei, Capri, Cilento, Costa d'Amalfi, Falerno del Massico, Irpinia, Ischia, Penisola Sorrentina, Sannio, Vesuvio

#### 3.2.1. IGT

Benevento o Beneventano\*, Campania\*, Civitella d'Agliano, Colli Cimini\*, Colli di Salerno\*, Daunia\*, Dugenta, Epomeo, Frusinate o del Frusinate, Lazio\*, Murgia\*, Paestum\*, Pompeiano\*, Puglia\*, Roccamonfina\*, Salento\*, Tarantino\*, Terre del Volturno\*, Valle d'Itria

\* è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta

## 4. CLONI ISCRITTI AL REGISTRO

Codice	Nome	Data emanazione	Codice proponente	G.U.	del
001	I - VCR 296	2009-03-27	2	G.U. 146	2009-06-26
002	I - VCR 297	2009-03-27	2	G.U. 146	2009-06-26
003	I - VCR 299	2009-03-27	2	G.U. 146	2009-06-26
004	I - VCR 147	2010-05-28	2	G. U. 189	2010-08-14

## Legenda codici proponenti

2) - Vivai Cooperativi di Rauscedo

**5. SUPERFICIE VITATA**

Evoluzione della superficie vitata dal 1970 ad oggi, rilevata dai censimenti ISTAT (dati espressi in ettari).

1970	1982	1990	2000	2010
4.506	2.413	1.338	1.013	699

**6. PRODUZIONE VIVAISTICA**

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2011 all'ultimo dato disponibile.

Anno	Standard	Certificato	Base	Iniziale *
2019	17.776	41.190	-	-
2018	15.118	29.526	-	448
2017	18.371	90.499	-	-
2016	10.304	64.600	-	-
2015	7.342	45.157	-	-
2014	13.216	19.580	-	-
2013	42.676	-	-	-
2012	12.999	39.557	-	-
2011	42.675	3.360	-	71

\* : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005